



7676: ESCA SICURA Ricarica per Ratti e Topi

Junior

Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione n. 11567 del Ministero della Salute

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone puro	0,005 g
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a	100 g

Caratteristiche

Esca topicida raticida per impiego domestico e civile, L'elevata appetibilità la rende efficace contro tutte le specie di muridi quali *Rattus rattus* (ratto nero o dei tetti o ratto alessandrino), *Rattus norvegicus* (ratto grigio o delle fogne o pantegana o surmolotto), *Mus musculus* (topo domestico o sorcio), topi campagnoli e arvicole. Agisce per ingestione ed è sufficiente che il muride si cibi dell'esca anche una sola volta perché si esplichino gli effetti letali. La morte sopraggiunge in seguito alle emorragie interne nel giro di 6 - 10 giorni senza destare diffidenza negli altri componenti la colonia. Topi e ratti una volta intossicati, vengono presi dal senso di soffocamento e tendono ad andare a morire all'aperto.

Modalità d'impiego

Collocare una dose adeguata di esca negli appositi contenitori di sicurezza Sandokan, o comunque avvalendosi di materiali in grado di occultarle ed impedirne l'ingestione da parte di animali non bersaglio. È importante posizionare le esche nei luoghi più frequentati dai muridi, in particolare i siti di alimentazione, piste e tane. Verificare periodicamente il consumo dell'esca ed eventualmente rinnovarla fino alla totale scomparsa dei muridi indesiderati.

Norme precauzionali

- Manipolare con prudenza.
- Conservare il prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.
- Usare guanti protettivi in gomma o PVC.
- Non contaminare alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Dopo la manipolazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di incidente consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).



Avvertenze

- Non ingerire.
- Il prodotto è pericoloso per ingestione e per contatto con la pelle.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Informazioni per il medico

Sintomi: avvelenamento grave per ingestione, inibizione della vitamina K, emorragie cutanee e mucose. La sintomatologia a carico di altri sistemi o apparati è prevalentemente emorragica.

Terapia: in caso di ingestione di grosse quantità provocare il vomito, lavanda gastrica, monitorare attività protrombinica, se diminuzione somministrare Vitamina K.

Controindicazioni: anticoagulanti.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI